

Algoritmi e Strutture Dati – 04/06/2018

Esercizio 1 – Punti ≥ 6 (Parte B)

Si consideri un vettore X contenente n valori interi distinti.

Dato un insieme S di indici del vettore ($S \subseteq \{1, \dots, n\}$), il vettore \overline{X}_S negazione di X sugli indici S è tale per cui:

$$\overline{X}_S[i] = \begin{cases} -X[i] & i \in S \\ X[i] & i \notin S \end{cases}$$

Ad es., dato un vettore $X = [7, 4, -2, 10, 12, 5, 3, 8]$ e un insieme $S = \{2, 4\}$, $\overline{X}_S = [7, -4, -2, -10, 12, 5, 3, 8]$.

Un insieme di indici M di dimensione k è detto k -massimale se la somma degli elementi di \overline{X}_M è più grande o uguale della somma degli elementi di qualsiasi vettore \overline{X}_S , con $|S| = k$,

$$\sum_{i=1}^n \overline{X}_M[i] \geq \sum_{i=1}^n \overline{X}_S[i], \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\} : |S| = k$$

Scrivere un algoritmo che prenda in input un vettore X e un intero k , e restituisca la somma associata ad un insieme di indici k -massimale per X .

Ad esempio, dati un vettore $X = [7, 4, -2, 10, 12, 5, 3, 8]$ e $k = 2$, la somma massimale è data dall'insieme $S = \{3, 7\}$, $\overline{X}_S = [7, 4, \mathbf{2}, 10, 12, 5, -\mathbf{3}, 8]$, e il valore da restituire è pari a $7 + 4 + 2 + 10 + 12 + 5 - 3 + 8 = 45$.

Discutere esaurientemente correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3 – Punti ≥ 8 (Parte B)

Scrivere un algoritmo che, dati in input un vettore X contenente n interi distinti e un intero w , stampi tutti i modi in cui è possibile ottenere esattamente il valore w sommando un sottoinsieme dei valori contenuti in X .

Ad esempio, se $X = [-1, 3, 6, 4, 5, 7, 8]$ e $w = 13$, l'algoritmo deve stampare, non necessariamente in questo ordine:

```
5 + 8
6 + 7
3 + 6 + 4
-1 + 6 + 8
-1 + 3 + 4 + 7
-1 + 3 + 6 + 5
```

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale. Non perdetevi tempo a realizzare funzioni di stampa "s sofisticate", è sufficiente stampare – per ogni somma – l'elenco dei numeri che la compongono.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10 (Parte B)

Siano dati un vettore X contenente n valori interi positivi distinti e due valori interi positivi k, w , con $k \leq n$. La *somma massimale* (k, w)-vincolata di X è il più grande valore v ottenibile come somma di non più di k valori contenuti in X , tale che $v \leq w$. Formalmente,

$$v = \max_{S \subseteq \{1, \dots, n\} \wedge |S| \leq k} \sum_{i \in S} X[i]$$

$$v \leq w$$

Ad esempio, se $X = [12, 13, 11, 6, 23, 19]$, $w = 27$, $k = 3$, il valore da restituire è pari a $25 = 12 + 13$ oppure $19 + 6$. Non è possibile ottenere 26 o 27, nemmeno utilizzando tre valori.

Scrivere un algoritmo che dati in input X , n , k , w , restituisca il valore della somma massimale (k, w)-vincolata.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.